

BirdLife Suomen virallinen laskentaohje:

Pesivät parit lasketaan siten, että

- Haudonta-aikaan parimäärä saadaan kertomalla havaittu yksilömäärä 0,7:llä.
- Kuoriutumisaikaan havaittu aikuisten selkälökkien yksilömäärä jaetaan kahdella, josta saadaan parimäärä. Mikäli havaittu yksilömäärä on pariton, siihen lisätään yksi ja jaetaan näin saatu luku kahdella.
- Poikasaikaan parimäärä saadaan kertomalla havaittu yksilömäärä 0,7:llä.
- Kerrointa 0,7 käytetään haudonta- ja poikasaikaan siksi, että osa emoista on tällöin ruokintamatkoilla ja kuoriutumisaajan laskentakaava antaisi liian pienen parimäärän.
- Kohteen tulkitun parimäärän voi ilmoittaa Tiiran lisätietona.

Lentopoikaset lasketaan siten, että

- Laskenta tehdään vain niiltä pesimäalueilta, joilta on aiemmin keväällä varmuudella saatu täsmällinen parien tai munapesien lukumäärä.
- Mahdollisia lajimääritysvaikeuksia harmaalokkien lentopoikasiin voi vähentää ajoittamalla laskenta elokuun alkuun, jolloin nuoret harmaalokit yleensä ovat jo lähteneet kiertelemään, mutta pääosa selkälökkien poikasista on edelleen synnyinpaikoillaan.
- Lopulliseen aineistoon kirjataan pesintöjen suhteellinen tuotantoluku poikasista / pari. Tämä saadaan siten, että tiedetään havaintoalueen, esim. pesimäluodon, parien ja/tai pesien tarkka lukumäärä ja heinä-/elokuun vaihteen lentopoikasten kokonaismäärä ko. alueella. Havaittujen lentopoikasten kokonaismäärä jaetaan ko. havaintoalueella laskettujen pesien/parien lukumäärällä. Lentopoikasmäärää ei siis havainnoijan tarvitse tietää parikohtaisesti.
- Tiiraan ilmoitetaan lentopoikasten kokonaismäärä ja lisätietona pesien/parien lkm.